




Gemeente Amsterdam



Inrichting en beheer

Moeras

Gidssoorten:


- Roerdomp (groot), rietzanger (klein)
- Ringslang
- Waterspitsmuis
- Veenmos

Biodiversiteit:


Open water dat aan het verlanden is. In een moeras kan een vis niet zwemmen en een koe niet lopen. Moerassen bieden broed- en foerageerplek voor moerasvogels (o.a. baardmannetje, roerdomp, waterral), reptielen (ringslang) en zoogdieren (waterspitsmuis, marters, noordse woelmuis).

Doelen:

- Bepalen of moeras een bloemrijk moeras (doel flora, zoals veenmosrietland) moet zijn of rietmoeras (doel fauna)
- Variatie van nat rietland, droog rietland en open water met overjarig riet;
- Toename aantal kwalificerende soorten.




Lange moerasrand




Natuurlijk peilbeheer



Gefaseerd maaien



Verbossing beperken



Inrichting:

- ❑ Oppervlakte moeras sluit aan bij benodigd oppervlak gidssoort. Blauwborst met bomen/struiken (300 ha/ 30 ha). Roerdomp ca 300 m². Rietzanger 50 m². Baardman 10 ha (droog/nat).
- ❑ Creëer een lange moerasrand (1). Veel moerasvogels foerageren op de rand van moeras naar open water. Daarom heeft het de voorkeur een moeras zo in te richten dat er veel moerasrand voorkomt.
- ❑ Varieer nattere en drogere delen van het moeras.
- ❑ Indien mogelijk zelfstandig natuurlijk peilbeheer in het gebied: 's zomers hogere dan 's winters (2).

Beheer:

- ❑ Afhankelijk van het tempo waarin boomvormers het moeras koloniseren moet de vegetatie eenmaal per 3-5 jaar gemaaid worden (4).
- ❑ Als riet vaker gemaaid wordt, dan verliest het de waarde voor veel moerasvogels, maar kan een floristisch doel worden nagestreefd.
- ❑ <10% oppervlak tekenen van verruiging of verbossing heeft.
- ❑ Gefaseerd maaien (3).
- ❑ Natuurlijk peilbeheer, waarbij waterdiepte in de zomer 0,1-0,3 m is.
- ❑ Her en der bomen en struiken bevordert blauwborst.