Bijsturen met Beheer

Wat, wanneer, en waarom maaien
+ een blik op Klimaatverandering

Thijs Gerritsen
26 | Oktober | 2026
advies@cruydthoeck.nl

Cruydt Hoeck
WILDEBLOEMENZADEN INHEEMSE PLANTEN

SAMEN VOOR BIODIVERSITEIT



Zonlicht beschikbaar maken door maaien en afvoeren

Voor een soortenrijke en structuurrijke vegetatie t.b.v. insecten



1-2 keer per jaar maaien en afvoeren
matig droge klei
5-10 plantensoorten/25m2




1-2 keer per jaar maaien + afvoeren
matig droge klei
20-40 plantensoorten/25m2

AGRO FOOD NATURE HO GENT

© Biodivers Grasland 2026

https://biodiversgrasland.be/




Aantal jaren dat moet verschraald worden tot een Olsen-P van 25mg/kg via 2xmaaien, 3xmaaien en uitmijnen in de drie sites van het HerBioGras-experiment

AGRO FOOD NATURE HO GENT

© Biodivers Grasland 2026

https://biodiversgrasland.be/




Aantal jaren dat moet verschraald worden tot een Olsen-P van 25mg/kg via 2xmaaien, 3xmaaien en uitmijnen in de drie sites van het HerBioGras-experiment

" Is het dan hopeloos? Wat kunnen we doen?

AGRO FOOD NATURE HO GENT

© Biodivers Grasland 2026

https://biodiversgrasland.be/



Aantal jaren dat moet verschraald worden tot een Olsen-P van 25mg/kg via 2xmaaien, 3xmaaien en uitmijnen in de drie sites van het HerBioGras-experiment

" Is het dan hopeloos? Wat kunnen we doen?
Uit ons onderzoek blijkt dat we ook bij (té) hoge fosforconcentraties in de bodem tot zover mooie resultaten kunnen boeken. "



Zonlicht speelt een sleutelrol


Veel makkelijker te beïnvloeden dan bodemvoedselrijkdom

Direct meer zonlicht




Wat *groeit* er in augustus?

artikel Johansen et.al 2019



Wat *bloeit* er in augustus?

artikel Johansen et.al 2019



Ook relevant voor insecten

- Spreiding van voeding
  - Bladeren
  - Bloemen
  - Zaden
- Meer variatie in microklimaat



vroege resultaten Sinusbeheer

De Vlinderstichting



Lessen voor beheer

1. Timing is belangrijk
2. Denk aan ecologische relaties

Timing is belangrijk



1-2 keer per jaar **te laat** maaien en afvoeren
matig droge klei
5-10 plantensoorten/25m2



1-2 keer per jaar maaien + afvoeren
matig droge klei
20-40 plantensoorten/25m2

Timing is belangrijk

Maai meij wel!

1-2 keer per jaar **te laat** maaien en afvoeren
matig droge klei
5-10 plantensoorten/25m2

©2021 Aardewerk Advies

boekje bestellen



1-2 keer per jaar maaien + afvoeren
matig droge klei
20-40 plantensoorten/25m2

Timing is belangrijk

AGRO FOOD NATURE HO GENT

© Biodivers Grasland 2026

https://biodiversgrasland.be/





Denk aan ecologische relaties



Schuilmogelijkheden
kleine zoogdieren

Nestgelegenheid voor hommels









Tweejarigen de kans geven zich uit te zaaien





Een ander beheer in een ander klimaat?

Het *waarom* blijft hetzelfde,
maar het *wanneer* veranderd

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

KNMI'23 klimaatscenario's



Groeizamer najaar

~~September - Oktober~~

April - Mei ?



Extreme buien

Meer platgeslagen vegetaties?

Denk aan zonlicht




Droogte

Weten wanneer je niet moet maaien



Herwaardering kruiden



Bedankt en benieuw naar jullie reacties!



